

編輯團隊序

藥物濫用防制經驗中，我們深刻了解毒品不只危害個人的身心靈多層面，也影響家庭甚鉅，並且造成社會安全與發展之負擔，許多經驗提醒我們毒品危害無國界，是個全球性議題。為使大專院校教職員工生面對國際師生，有合宜之毒品防制參考資料，以強化校園反毒拒毒之知能，提高校園安全，特編此防制藥物濫用外語宣導手冊，邁向校園零毒品的目標。

藥物濫用防制衛教手冊，過去未設計專門提供外籍師生參考使用之版本，故今結集合多個專業團隊設計本手冊，以利向國際師生進行藥物濫用防制宣導之用。

本手冊以藥物濫用防制為目的，藉由手冊提高境外人士認識毒品、防範毒品及了解臺灣對毒品防制相關之法律規範；手冊中亦提供反毒戒毒資源，期盼外籍師生從中獲得實用資訊，避免遭受毒品危害。

若您對於本手冊有疑問，誠摯歡迎來函指教，本團隊將力求改善使之更臻完善。

防制藥物濫用外語宣導手冊編輯團隊 謹誌
2021年12月

防制藥物濫用宣導手冊

CONTENTS

壹、識毒篇	1
一、「毒品」定義	1
二、毒品的分類	1
三、臺灣常見毒品與危害	2
貳、防毒篇	9
一、提高警覺避免受害	9
二、拒毒 8 招	10
三、藥物濫用者的徵兆與協助	12
四、認識藥愛「CHemsex」	13
五、出入國境五不原則	15
參、資源篇	16
一、諮詢服務	16
二、補助方案	18
三、網站資源	20

肆、法令篇	21
常見毒品及相關罰則.....	21
氧化亞氮（笑氣）管制.....	23
伍、問答篇	24
Q1. 身為外籍學生，我該注意什麼？.....	24
Q2. 國際間對大麻規範的差異.....	25
Q3. 常見新興濫用藥物有哪些？.....	25
Q4. 近來常作為毒咖啡包的成分為何？.....	26
Q5. 使用安眠藥需要注意什麼？.....	26
Q6. 什麼是緩起訴附命戒癮治療？.....	27
Q7. 在臺灣，是否可以自行就醫進行戒癮治療？.....	27
參考資料來源	

壹 識毒篇

一、「毒品」定義

在臺灣，「毒品」依據《毒品危害防制條例》第 2 條，是指具有成癮性、濫用性及對社會危害性的麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品。

二、毒品的分類

依成癮性、濫用性及對社會危害性分為四級，其中第一、第二級毒品危害性通常大於第三、第四級毒品：

- 第一級：如海洛因、嗎啡、古柯鹼
- 第二級：如安非他命、搖頭丸、大麻
- 第三級：如愷他命、FM2、甲基甲基卡西酮（喵喵）
- 第四級：如佐沛眠、丙泊酚（牛奶針）

依毒品特性區分：

- 中樞神經興奮劑：如安非他命、MDMA（搖頭丸）、MDPV（浴鹽）、喵喵、PMMA
- 中樞神經迷幻劑：如大麻、類大麻（K2）
- 中樞神經抑制劑：如海洛因、嗎啡
- 吸入性濫用物質：如笑氣、強力膠、Rush 等

三、臺灣常見毒品與危害

第一級毒品



海洛因



嗎啡

- 使用後副作用包括呼吸抑制、噁心、嘔吐、眩暈、精神恍惚、焦慮、搔癢、血壓降低等。
- 長期使用，一旦不使用時，產生的戒斷症狀包括渴藥、不安、打呵欠、流淚、流鼻水、盜汗、失眠、厭食、腹瀉、噁心、嘔吐、發冷、腹痛、肌肉疼痛等症狀，約 7 至 10 天症狀才會漸趨緩和。
- 海洛因毒性是嗎啡的 10 倍，且成癮性較嗎啡強，戒斷症狀亦極為嚴重，濫用海洛因者常因共用針具（包括針頭、針筒、稀釋液）注射毒品、使用不潔針具，而感染愛滋病、病毒性肝炎（B 或 C 型肝炎）、心內膜炎、靜脈炎等疾病。

第二級毒品



(甲基)安非他命
(甲基苯丙胺)

- 長期使用會出現妄想型思覺失調症，也常伴有自殘、暴力攻擊行為等。
- 安非他命類藥物具抑制食慾的作用，常被不法人士摻入減肥藥中非法販賣，使用藥者在不知情的情況成癮。



MDMA (搖頭丸)

- 作用與安非他命相似，施用過量時會產生中毒症狀，包括體溫過高（可高達攝氏 43 度）、脫水、急性高血壓、心律不整、橫紋肌溶解及急性腎衰竭等症狀，嚴重者可能導致死亡。

第二級毒品



大 麻


- 屬於中樞神經迷幻劑。吸食後會有心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象。長期使用會產生藥物耐受性及心理依賴性。一旦產生依賴性，突然停用會產生厭食、焦慮、不安、躁動、憂鬱、睡眠障礙等戒斷症狀。
- 青少年時期使用大麻會造成智商下降，記憶及學習能力降低，且大麻帶來的幻覺作用會造成知覺異常，導致交通事故等公共危險傷害。
- 懷孕婦女吸食大麻容易造成早產、胎兒體重偏低。
- 大麻使用方式除煙吸外，亦常提煉成液狀，混合在電子菸煙油內，或製成餅乾、巧克力等食物。然**大麻在臺灣為第二級毒品，種植、運輸、販賣、轉讓、施用或持有，都屬犯罪行為。**

第三級毒品



愷他命
(K他命、氯胺酮)

- 濫用愷他命會罹患慢性間質性膀胱炎，使膀胱壁纖維化增厚，容量變小，產生頻尿、尿急、小便疼痛、血尿等症狀，嚴重者甚至會出現尿量減少、水腫等腎功能不全的症狀，甚至須進行膀胱重建手術。此外，認知功能（注意力和記憶力）與情緒穩定度也會受及影響。



苯二氮平類安眠鎮靜劑
(如一粒眠、FM2)

- 長期使用會產生耐受性、依賴性及出現嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退，反應力變差等症狀。
- 同時併用酒精或其它中樞神經抑制劑，常導致精神恍惚，造成意外或因吸入嘔吐物而致死。

新興毒品

特性 1：多樣化的偽裝，鬆懈年輕族群警覺性

- 常見形式為摻入沖泡式飲品粉末，再以市售或自創品牌包裝的型態販售，或將毒品製成毒郵票、毒果凍、毒巧克力等樣式吸引年輕族群。
- 具迷幻作用的類大麻活性物質（K2），會噴灑在菸草或乾燥花草表面，以乾燥植物或花草茶包之形式販售。

特性 2：多種成分混和，不純且無均質

- 混用藥理作用相反或作用相似的毒品，會對身體造成嚴重傷害，若再與酒類併用，可能導致藥效加劇，發生無法預期的結果。

特性 3：組織性的行銷

- 現今毒品行銷朝產業鏈發展，常以首次免費供應的方式提供，不只透過幫派或組織行銷，甚至發起「團購」販售，藉由同儕影響並引誘青少年開始濫用藥物。

毒咖啡包？

混合式毒品致死率高！

小心包裝？幾可亂真！

常混摻2種以上毒品種類，最常見內含物有K他命、搖頭丸、
甲基安非他命、卡西酮、喵喵及FM2等，不要好奇嘗試。



圖片來源：內政部警政署毒品防制科

根據法務部 法醫研究所統計

109年上半年新興毒品相關死亡案件，
共計98件，平均驗出4種毒品成份。

偽製化包裝？

市售商品，重新包裝，有拆封痕跡；
山寨品牌，沒有拆封痕跡；
自創品牌，包裝完整，無製造標示，各式新
流行圖標。



教育部及特種學
務局毒品防制科



法務部法醫研究所
藥物檢驗室毒品組



國家警察學院
毒品防制組



各縣市毒防中心24小時諮詢專線
0800-770-885

緝毒專線
110



教育部
Ministry of Education

關心您 國

氧化亞氮（笑氣）

- 為短效的吸入性全身麻醉劑，吸入約 15 到 30 秒即可產生效果，並可持續 2 到 3 分鐘。
- 氧化亞氮會影響活性維生素 B₁₂ 的生成，長期使用會產生末梢神經及脊髓病變，出現手麻、腳麻、無力走路、立體感完全喪失等症狀，並可能產生精神異常，如嗜睡、抑鬱或精神錯亂等。
- 使用時若與酒精或其他藥物併用，容易有中毒危險，並造成嚴重身心傷害。

別讓笑氣笑掉你的人生!

笑氣學名為「一氧化二氮」或「氧化亞氮」，是一種無色有甜味的氣體，俗名為吹氣球。

嚴重可能成為植物人或死亡，造成無法恢復的傷害，請勿任意嚐試。
別因一時的狂歡作樂造成無法彌補的傷害

笑氣的危害性？

- ☑ 出現幻覺
- ☑ 身體癱瘓
- ☑ 手腳麻木
- ☑ 精神疾病
- ☑ 四肢萎縮
- ☑ 神經病變
- ☑ 無法行走
- ☑ 大小便失禁

各縣市藥品監督 0800-770-885
教育部 關心您

貳 防毒篇

一、提高警覺避免受害

- 毒品可能被製造成外表討喜的糖果、巧克力等零食，或是偽裝為咖啡包、茶包、奶茶包，**應留意封口是否有重複包裝的痕跡。**
- 朋友經常是毒品取得的來源。面對同儕的壓力要求使用菸、酒、檳榔、毒品及特殊糖果、飲品等時，可使用**直接拒絕、找尋藉口、速離現場、轉移話題、自我解嘲、友誼勸服等方式，語氣委婉態度堅定的拒絕。**
- 遠離是非場所，如網咖、Pub、夜店等；提高警覺，**不輕易接受陌生人的飲料及菸品，更別讓已開封的飲料離開視線；特別小心朋友的朋友，即使是熟識或女性也不可掉以輕心。**
- 當感覺到頭暈、噁心或嘔吐、視力模糊或影像扭曲、全身癱軟或無力、無法控制的過度活動、莫名焦慮、妄想、幻覺等，應採取下列處理方式：
 - (1) 把握時間，快速離開現場。
 - (2) 向可靠的人求助
 - (3) 打 110 報警

二、拒毒 8 招

面對同儕、藥頭的引誘，請您跟我這樣說

- **堅持拒絕法**

我不做違法的事情

不行，我真的不想吸

- **告知理由法**

吸毒是違法犯罪的事，你不要害我

我爸媽管很嚴，被他們知道我就慘了

- **自我解嘲法**

沒辦法，我就是害怕，不要嘗試算了！

不行，我真的很膽小，我不敢吸啦！

- **藉故離開現場法**

時間太晚了，我必須要回家，我先走了

我覺得身體不舒服，我先回家休息了！

- **友誼勸服法**

我們是好朋友，我不希望你變成吸毒犯！

不要吸啦！這對身體不好，好朋友一場，你我最好不要嘗試吧！

- **轉移話題法**

你看，這個點心很好

吃喔！你也試試看！今天新聞報導小貓照的影片，超萌的，你看過了嗎？


- **反說服法**

這毒品是會上癮的，而且很難戒除，你看昨天新聞報導那個吸毒者下場多慘……，所以你也不要吸啦！

- **反激將法**

如果因為你們說我沒膽量，我就吃，那我就真的太沒主見了！

堅定的自信是抗拒毒品誘惑的最好態度，面對毒害，請堅持拒絕。



三、藥物濫用者的徵兆與協助

- 作息改變

晚睡、不睡、徹夜不歸、日夜顛倒、連續睡 2、3 天

- 情緒不穩

情緒起伏大、易怒多疑、異常興奮、頹喪無力、精神狀態不佳

- 行為異常

行為衝動、莫名摔擲東西、髒話謔語、缺曠課多、逃家、輟學、勒索或霸凌、胡言亂語、說話語意不清、出現頻尿症狀

- 特殊物品

粉末、吸食器、夾鏈袋

如何協助藥物濫用者

- ✓ 觀察作息、關懷生活
- ✓ 鼓勵就醫、接受篩檢
- ✓ 資源連結、協助就醫
- ✓ 支持陪伴、接納親友



四、認識藥愛「CHemsex」

1. 定義：又稱以藥助「性」，性行為時合併使用成癮性藥物，增強性行為時感官或感受。
2. 情境：常見於網路交友、派對活動等情境。
3. 藥物：非鴉片類成癮性藥物（例如：甲基安非他命、K他命、搖頭丸、大麻、G水、喵喵等），國內常見藥物為甲基安非他命。

【如果同時使用藥物 + 酒精，可能會有致命危險喔！】


4. 方式：常見以吸食或注射（slam）等方式施用。
5. 效果：用藥後出現自制力降低、感官增強、渴望性愛等感受，容易影響認知思考與判斷力，繼而發生未有保護措施的性行為，且可能使性與用藥成癮造成連結。
6. 危險：因不安全性行為頻次增加，而大幅提升感染愛滋毒、梅毒或淋病等性傳染病之風險。



遠離愛滋 藥愛減害

愛滋篩檢

1. 有性行為者，至少進行 1 次篩檢。
2. 有無套性行為者，每年至少進行 1 次篩檢。
3. 若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、並使用成癮性藥物、感染性病等），建議每 3~6 個月篩檢 1 次。



避免風險行為

1. 拒絕使用毒品
2. 避免共用針具（包含針頭、稀釋液、容器）
3. 避免多重性伴侶或與陌生人發生性行為（尤其要小心網路交友喔！）

暴露愛滋病毒「前」預防性投藥 (PrEP)


在發生風險行為前，透過穩定服用 PrEP 藥物，降低被愛滋病毒感染的風險，保護力可達 90%。



五、出入國境五不原則

Don't Let Yourself Become
the Next Death Penalty Statistic for
**CROSS-BORDER DRUG
SMUGGLING**

Overseas drug smuggling incidents keep increasing.
Several Taiwanese drug smugglers have been sentenced to death in Southeast Asia.



The illustration depicts an airport security checkpoint. A man in a grey hoodie and purple pants stands with his hands raised, passing through a metal detector. A police officer in a white uniform and cap stands to the right, holding a black object. To the left, a woman in a grey shirt and dark pants stands near a luggage carousel. A red skull and crossbones warning sign is visible on the metal detector. The background is a bright yellow sun over a red ground. Several red exclamation marks are scattered around the scene.

- X 不貪心惹禍上身
- X 不接受可疑陌生人招待
- X 不幫忙陌生人提行李
- X 不幫忙陌生人夾帶物品
- X 視線不離開自己行李



資源篇


一、諮詢服務

各縣（市）政府毒品危害防制中心

24 小時免費諮詢專線：0800-770-885

服務內容：

為藥癮者本人或家屬提供諮詢服務，包含戒癮治療、愛滋病篩檢、心理輔導、醫療、法律諮詢、社會扶助、職業訓練與就業協助、就學輔導、減害計畫、民間戒癮機構及其他相關諮詢。



各縣市政府警察局外事科 / 行政科聯絡電話

縣市政府警察局外事科 / 行政科	聯絡電話
臺北市政府警察局外事科	02-23817494
新北市政府警察局外事科	02-80725454 Ext 4096
桃園市政府警察局外事科	03-3335107
臺中市政府警察局外事科	04-23273875
臺南市政府警察局外事科	06-6354531
高雄市政府警察局外事科	07-2215769
基隆市警察局外事科	02-24252787
新竹市警察局外事科	03-5242103
新竹縣政府警察局外事科	03-5557953
嘉義市政府警察局外事科	05-2220772
嘉義縣警察局外事科	05-3620220
苗栗縣警察局外事科	037-356950
彰化縣警察局外事科	04-7615463
南投縣政府警察局外事科	049-2234302
雲林縣警察局外事科	05-5329033
屏東縣政府警察局外事科	08-7336283
宜蘭縣政府警察局外事科	039-353921
花蓮縣警察局外事科	03-8224023
臺東縣警察局外事科	089-334756
澎湖縣政府警察局外事科	06-9278466
金門縣警察局行政科	0823-25653
連江縣警察局行政科	0836-25859 Ext 2102

二、補助方案

衛生福利部「藥癮治療費用補助方案」

- 補助對象：具健保身分者
- 補助項目：非健保給付之自費藥癮醫療費用
- 補助額度：在部分特定治療項目有補助
 - (1) 18 歲 (含) 以上：每年以 3 萬 5,000 元為限
 - (2) 未滿 18 歲：每年以 4 萬元為限

指定藥癮戒治機構及
替代治療執行機構名單



「藥癮治療性社區服務模式
多元發展計畫」聯絡資訊



相關疑問請洽**毒品危害防制中心** 24 小時免費諮詢專線：

0800-770-885

教育部「大專院校藥物濫用防制諮商輔導計畫」

• 服務對象

大專校院施用毒品學生，視情況提供高中以下個案必要支援。


• 服務內容

- (1) 個別諮商及家族治療，可透過視訊進行遠距諮商。
- (2) 每位學生提供 6 至 8 次免費諮商服務，若經心理師專業評估後有展延需求，經同意後可再展延合宜之諮商次數。

• 聯絡方式

(02) 7749-5720

自行求助學生，不會告知就讀學校，免除校規懲處疑慮



三、網站資源

國內藥物濫用防制相關資訊網站

網站名稱	網址
衛生福利部	http://www.mohw.gov.tw
衛生福利部食品藥物管理署 反毒資源專區	http://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=10070
教育部防制學生藥物濫用資源網	http://enc.moe.edu.tw
法務部反毒大本營	http://antidrug.moj.gov.tw
內政部警政署刑事警察局 / 常見 毒品專區	https://cib.npa.gov.tw/ch/app/folder/48

國外藥物濫用防制相關資訊網站

機構名稱	網址
United Nations Offices on Drugs and Crime (UNODC)	http://www.unodc.org
International Narcotics Control- Board (INCB)	http://www.incb.org
World Health Organization (WHO)	http://www.who.int/substance_abuse/en
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)	http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm
National Institute on Drug Abuse (NIDA)	http://www.drugabuse.gov

肆 法令篇

常見毒品及相關罰則

分級	第一級毒品	第二級毒品
常見毒品	海洛因、嗎啡、古柯鹼	甲基安非他命、MDMA、大麻、MDPV、恰特草
製造、運輸、販賣	死刑或無期徒刑 (得併科 3,000 萬元以下罰金)	無期徒刑或 10 年以上有期徒刑 (得併科 1,500 萬元以下罰金)
引誘他人施用	3 年以上 10 年以下有期徒刑 (得併科 300 萬元以下罰金)	1 年以上 7 年以下有期徒刑 (得併科 100 萬元以下罰金)
轉讓	1 年以上 7 年以下有期徒刑 (得併科 100 萬元以下罰金)	6 月以上 5 年以下有期徒刑 (得併科 70 萬元以下罰金)
施用	6 月以上 5 年以下有期徒刑	3 年以下有期徒刑
持有	3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金	2 年以下有期徒刑、拘役或 20 萬元以下罰金
	純質淨重達 10 公克以上 1 年以上 7 年以下有期徒刑 (得併科 100 萬元以下罰金)	純質淨重達 20 公克以上 6 月以上 5 年以下有期徒刑 (得併科 70 萬元以下罰金)

分級	第三級毒品	第四級毒品
常見毒品	愷他命、一粒眠、FM2、喵喵(4-甲基甲基卡西酮)、卡痛	佐沛眠、煩寧、蝴蝶片、牛奶針(丙泊酚、異丙酚)
製造、運輸、販賣	7年以上有期徒刑 (得併科1,000萬元以下罰金)	5年以上12年以下有期徒刑 (得併科500萬元以下罰金)
引誘他人施用	6月以上5年以下有期徒刑 (得併科70萬元以下罰金)	3年以下有期徒刑 (得併科50萬元以下罰金)
轉讓	3年以下有期徒刑 (得併科30萬元以下罰金)	1年以下有期徒刑 (得併科10萬元以下罰金)
施用	2萬元以上5萬元以下罰鍰，並接受6小時以上8小時以下之毒品危害講習	1萬元以上5萬元以下罰鍰，並接受4小時以上6小時以下之毒品危害講習
持有	2萬元以上5萬元以下罰鍰，並接受6小時以上8小時以下之毒品危害講習	1萬元以上5萬元以下罰鍰，並接受4小時以上6小時以下之毒品危害講習
	純質淨重達5公克以上 2年以下有期徒刑 (得併科20萬元以下罰金)	純質淨重達5公克以上 1年以下有期徒刑 (得併科10萬元以下罰金)
目前臺灣各級毒品列管超過600種，許多在母國合法物質，於臺灣可能觸犯法律		

氧化亞氮（笑氣）管制


毒性及關注化學物質管理法

- 非法持有笑氣，處 3 萬到 30 萬元罰鍰
- 若致人於死或危害人體健康，最高處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑，併科罰金最高 1000 萬元
- 透過網購、郵購販售笑氣，平台業者處 6 萬元到 30 萬元，並按次處罰

社會秩序維護法

- 施用者處 3 日以下拘留或新臺幣 1 萬 8,000 元以下罰鍰

笑氣根本不好惹!




笑氣學名為「一氧化二氮」或「氧化亞氮」，是一種無色有甜味的氣體。

依「**毒性及關注化學物質管理法**」規定未經核可擅自非法買賣或使用笑氣者，可處**新臺幣3萬起至30萬元罰鍰**，若因而致人於死或危害人體健康，則最重可處**無期徒刑或七年以上有期徒刑**併科罰金最高**新臺幣1,000萬元**。

愛惜自己與家人 勿以身試法

相關資源可洽各縣市毒品危害防制中心：
諮詢專線 **0800-770-885** (請撥分機號碼)

教育部
Ministry of Education 關心您



伍 問答篇

Q1. 身為外籍學生，我該注意什麼？

- 留意校規

校園內「學生獎懲辦法」，常有針對學生碰毒及觸法的處置辦法（例如：記大過或退學）

- 考量生涯

接觸毒品除了面對法律外，可能因此喪失在臺灣工作或居留的機會（例如：參與建教合作的外籍生）

- 遠離毒品

保護自己，維持健康



Q2. 國際大麻規範的差異性

全面非法 → 臺灣、日本、印尼、越南、馬來西亞

娛樂或醫療用合法 → 烏拉圭、泰國、美國部分州、加拿大

Q3. 常見新興濫用藥物有哪些？

- Methylone(bk-MDMA)
- Mephedrone (俗稱喵喵)
- MDPV (俗稱浴鹽)
- TFMPP (Molly)
- 對 - 氯安非他命 (俗稱 PCA 或 4CA)

常含有具中樞神經興奮作用之

合成卡西酮類成分，危害性大



Q4. 近來常作為毒咖啡包的成分為何？

1. PMMA

藥性慢，危害大，使用者常誤以為效果不大，不小心就加量使用，而導致過量服用，致死案例不少

危害常見不良反應包含躁動、幻覺、昏迷、抽搐、體溫過高、橫紋肌溶解、呼吸衰竭、心律不整等，甚至致死

2. 甲基甲基卡西酮（喵喵，Mephedrone）

具強烈成癮性，不良反應包含心悸、血壓升高及精神症狀。停止使用會產生憂鬱、焦躁、顫抖、睡眠障礙、妄想等症狀

Q5. 使用安眠藥需要注意什麼？

管制藥品	非經醫師處方使用鎮靜安眠藥品，屬於違法
醫師處方	務必找醫師詳細評估詢問
依照醫囑	不能自行增加或刪減藥量， 也不宜任意更改服藥時間
避免飲酒	以免產生較強的藥品副作用
良好睡眠	養成規律生活，睡前 2 小時少用 3C 產品
逐漸減量	勿驟然停藥，小心戒斷症狀或反彈性失眠

Q6. 什麼是緩起訴附命戒癮治療？

對象	施用第一或第二級毒品者
方式	原則為門診或其他非拘束人身自由方式
項目	藥物治療、心理治療、復健治療、毒品檢驗、其他可避免病情惡化或提升預防復發能力之措施
規範	一年內需至指定醫療院所進行治療流程，另須定期到觀護人室報到及接受尿液檢驗

Q7. 在臺灣，是否可以自行就醫進行戒癮治療？

可以

毒品危害防制條例規定，施用第一、二級毒品，於犯罪未發覺前，自動向衛生福利部指定之醫療機構請求治療，醫療機構免將請求治療者送法院或檢察機關。

有物質成癮的困擾，臺灣的法律會鼓勵您自行就醫